



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN  
mun. Chișinău

„12” „02” 2016

nr. 57

Cu privire la măsurile de prevenire  
și control al infecției cu virusul Zika

Infecția cu virusul Zika s-a răspândit intens începând cu anul 2015 și continuă să se înregistreze în țările Americii de Sud, Africii, Asiei și regiunii Pacific, afectând pînă la moment aproximativ 36 țări, cu izbucniri în mai multe teritorii. În cîteva țări ale Uniunii Europene (Austria, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Portugalia, Olanda, Spania, Suedia și Marea Britanie) au fost raportate cazuri de boală importate, fără transmitere autohtonă a virusului Zika.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat înregistrarea recentă a unui cluster (focar) de microcefalie fetala și alte tulburări neurologice raportate în Brazilia ca urgență de sănătate publică de interes internațional, fiind suspectată asocierea între infecția cu virusul Zika în timpul sarcinii și microcefalia la făt.

Conform prevederilor Regulamentului Sanitar Internațional (RSI 2005) și recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) nu sunt impuse măsuri de limitare sau interzicere a călătoriilor și comerțului internațional.

În scopul realizării măsurilor de prevenire a importului și răspîndirii infecției cu virusul Zika, implementării prevederilor RSI 2005 și recomandărilor OMS, și în temeiul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011,

**ORDON:**

1. Conducătorii Direcției Sănătății a Consiliului municipal Chișinău, Serviciului Sănătate a Primăriei municipiului Bălți, Direcției Sănătății și Protecției Sociale a UTA Găgăuzia, instituțiilor medico-sanitare publice, serviciilor medico-sanitare ale ministerelor și autorităților administrațiilor publice centrale, medicii șefi ai Centrelor de Sănătate Publică, în limita competenței, vor asigura:

- 1) actualizarea planurilor instituționale și teritoriale de pregătire și răspuns la situații excepționale și urgențe de sănătate publică, cu includerea măsurilor de prevenire și control al infecției cu virusul Zika;
- 2) sporirea vigilenței pentru depistarea precoce a posibililor bolnavi în baza colectării detaliate a anamnezei epidemiologice – sosirea în ultimele 3 săptămîni din teritorii cu transmitere locală a infecției (țările Americii de Sud, Africii, Asiei și regiunii Pacific) și manifestărilor clinice ”erupție

- maculară sau papulară, artrită sau artralgie, sau conjunctivită non-purulentă, microcefalie la făt”;
- 3) actualizarea cunoștințelor în domeniul manifestărilor clinice, diagnosticului și măsurilor de prevenire și control al infecției cu virusul Zika;
  - 4) evaluarea și suplینirea stocurilor de echipament personal de protecție, medicamente și preparate biodistructive;
  - 5) suspectarea cazului de boală cu spitalizarea în secțiile de boli infecțioase a IMSP teritoriale, IMSP SCBI ”Toma Ciorbă” și inițierea tratamentului nespecific;
  - 6) consultarea pacienților suspecti/bolnavi cu specialiștii IMSP SCBI ”Toma Ciorbă”;
  - 7) notificarea nominală despre persoana suspectă/bolnavă cu completarea formularului nr. 058/e, inclusiv în sistemul electronic de supraveghere, cu informarea Centrului teritorial de Sănătate Publică și Centrului Național de Sănătate Publică (CNSP) (Punctul Focal Național pentru RSI, tel./fax 022574-557, e-mail [smasp@cnspl.md](mailto:smasp@cnspl.md));
  - 8) notificarea cazului în sistemul de supraveghere epidemiologică în baza definiției de caz care include descrierea clinică: afecțiunea care se caracterizează prin erupție maculară sau papulară, artrită sau artralgie, sau conjunctivită non-purulentă; microcefalie la făt; criteriile de laborator pentru diagnostic: izolarea virusului; detectarea acidului nucleic al virusului Zika; serologia pozitivă.

Cazurile se clasifică după cum urmează:

Posibil:	N.A.
Probabil:	Un caz compatibil cu descrierea clinică și legătură epidemiologică
Confirmat:	Un caz compatibil cu descrierea clinică și confirmat în laborator

- 9) organizarea prelevării și transportării probelor (sânge, urină) de la bolnav sau persoana suspectă, cu respectarea cerințelor de biosiguranță, în laboratorul bolilor extrem de contagioase, diareice acute și zooantroponozelor, Centrul Național de Sănătate Publică (tel. 022737-322), str. Gh.Asachi 67A, bloc III, et I, mun. Chișinău.
- 10) respectarea de către personalul medical a regulilor standard de precauțiune la lucrul cu pacienții cu boli infecțioase;
- 11) implementarea măsurilor de control a bolii, inclusiv informarea bolnavului despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire a transmiterii infecției (evitarea contactului sexual pe perioada bolii, transfuziei de sânge) la alte persoane;
- 12) realizarea măsurilor de comunicare cu populația și mass-media privind infecția cu virusul Zika și măsurile de prevenire (anexă).

2. IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorba” va asigura consultarea persoanelor suspecte/bolnave prin infecția cu virusul Zika, la solicitarea instituțiilor medico-sanitare.

3. Centrul Național de Sănătate Publică va asigura:

- 1) monitorizarea situației epidemiologice în lume privind infecția cu virusul Zika cu consultarea buletinelor epidemiologice editate de OMS, ECDC;
- 2) evaluarea riscurilor pentru sănătatea publică și informarea operativă a autorităților relevante;
- 3) transportarea probelor pentru investigare în laboratoarele de referință ale OMS, la necesitate;
- 4) schimbul de informații cu Punctul Focal al BRE OMS pentru Regulamentul Sanitar Internațional;
- 5) comunicarea cu populația și mass-media pentru difuzarea recomandărilor și informațiilor relevante.

4. Centrele de Sănătate Publică teritoriale și departamentale vor asigura:

- 1) elaborarea recomandărilor în adresa autorităților publice locale privind realizarea măsurilor de dezinsecție și delarvare a locurilor de multiplicare a țânțarilor (bazine acvatice, vegetația din preajmă, precum și a încăperilor, subsolurilor etc.);
- 2) desfășurarea activităților de pregătire tematică a colaboratorilor punctelor de trecere a frontierei (Poliția de frontieră, Serviciul Vamal), Agențiilor de turism, etc. în realizarea măsurilor primare la depistarea persoanelor suspecte la infecția cu virusul Zika;
- 3) informarea de urgență în cazul depistării persoanelor suspecte/bolnave prin infecția cu virusul Zika a Centrului Național de Sănătate Publică la tel/fax 022574-557, e-mail smasp@cnspl.md, secția de monitorizare a alertelor de sănătate publică și organizarea realizării măsurilor de sănătate publică la locul depistării și spitalizării;
- 4) informarea autorităților publice locale, direcțiilor teritoriale protecție civilă și situații excepționale, agențiilor de turism pentru coordonarea măsurilor;
- 5) conlucrarea cu subdiviziunile teritoriale ale autorităților competente în punctele de trecere a frontierei (Poliția de Frontieră, Serviciu Vamal) în scopul inițierii și realizării, la necesitate, a măsurilor de control sanitar;
- 6) comunicarea cu populația și mass-media privind infecția cu virusul Zika și măsurile de prevenire

5. Centrul Național de Sănătate Publică, IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” vor asigura acordarea ajutorului consultativ-metodic instituțiilor medico-sanitare și CSP privind principiile de acordare a asistenței medicale, măsurile de prevenire și răspuns la infecției cu virusul Zika.

6. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dnei Aliona Serbulenco, viceministru.

Ministru



Ruxanda GLAVAN

## **Cu titlul informativ. Infecția cu virusul Zika și măsurile de prevenire**

Boala este cauzată de un virus din genul *Flavivirus*, familia *Flaviviridae*, fiind transmisă prin intermediul țânțarilor, îndeosebi *Aedes aegypti*. Această specie de țânțari se întâlnește preponderent în regiunile tropicale, în Republica Moldova specia menționată nu se înregistrează.

Perioada de incubație variază între 3-12 zile după înțepătura țânțarului infectat. Majoritatea cazurilor de boală (60–80%) evoluează asimptomatic. De obicei, maladia are o evoluție clinică ușoară, cu caracter autolimitant – stare febrilă timp de 4-7 zile, fără complicații severe sau decese asociate și o rată joasă de spitalizare. Principalele simptome sunt erupția maculară sau papulară, ce apare inițial pe față, apoi pe tot corpul, febră moderată, dureri în mușchi, articulații, cefalee, conjunctivită.

Este dovedită posibilitatea transmiterii transplacentare a virusului de la mamă la făt cu dezvoltarea la acesta a microcefaliei, de asemenea transmiterea pe cale sexuală sau prin sânge și produse de sânge.

Nu există tratament specific sau vaccin pentru a proteja împotriva infecției cu virusul Zika.

Măsurile de prevenire a bolii sunt focusate pe respectarea regulilor de comportament pentru evitarea înțepăturii de țânțar la aflarea în teritorii cu transmitere locală a infecției cu virusul Zika (țările Americii de Sud, Africii, Asiei și regiunii Pacific).

Se recomandă:

- a) evitarea călătoriilor, îndeosebi de către femeile însărcinate, în teritorii cu transmitere locală a infecției cu virusul Zika;
- b) respectarea măsurilor de prevenire a înțepăturii țânțarilor în timpul aflării în teritorii cu risc, inclusiv: evitarea plimbărilor în perioada de maximă activitate a țânțarilor, purtarea hainelor de culoare deschisă care acoperă în mare măsură tot corpul (cămăși cu mânecă lungă, pantaloni lungi), folosirea substanțelor repelente, utilizarea plaselor pentru preîntâmpinarea pătrunderii țânțarilor în încăperi;
- c) adresarea la medicul de familie în caz de apariție a semnelor de boală, în special la persoanele revenite în ultimele 3 săptămâni din călătorii în țările cu transmitere locală a infecției cu virusul Zika;
- d) femeile însărcinate vor informa obligatoriu medicul de familie despre vizitarea/aflarea în teritorii cu risc în scopul asigurării, la necesitate, a supravegherii medicale și tratamentului respectiv.